

مرشد للعلاج الذاتي

Flaminal Hydro- Flaminal Forte

عزيزي المريض

وصف لك أحد أعضاء الطاقم الطبي Flaminal Forte أو
Flaminal Hydro للاستخدام المنزلي. لقد قمنا بتضمين
المعلومات ذات الصلة حول الإعداد الذي تلقينه وتعليمات
الاستخدام.
يجب اتباع التعليمات بعناية

الموانع:

لا تستخدم المنتج إذا كان لديك حساسية
معروفة تجاه أحد المكونات.
لا يوضع على الجفون أو العين. في حالة
ملامسة العينين ، اشطفها على الفور بكمية
كبيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

مزايا استخدام flaminal التي
تضمن سرعة الشفاء: يحافظ على
الجرح نظيفاً. يحافظ على توازن
الرطوبة في الجرح ويسمح بظروف
الشفاء المثلى. آمن للجلد وأنسجة
الجرح. يحمي حافة الجرح
ويعالجها ويوفر الحماية ضد
البكتيريا. يقلل الرائحة من الجرح.

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص استخدام Flaminal ، يمكنك الاتصال بنا على Info@cwt.org.il
أو عن طريق الهاتف على الرقم 1810-397-072. يمكن العثور على معلومات إضافية على موقع الشركة www.cwt.org.il
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص علاجك أو جرحك ، نوصيك بالاتصال بممرضتك أو طبيبك

BR100/01 OCT.-20



الخطوة 1 التنظيف




- قبل وضع Flaminal Forte / Hydro ، اغسل يديك وجففهما.
- بعد ذلك ، يجب تنظيف الجرح والمنطقة المحيطة به بالماء النظيف أو بمنتج لتنظيف الجرح وفقاً للنصيحة التي تلقيتها من الطاقم الطبي.
- إذا كانت هناك أي بقايا ملتهبة من الاستخدام السابق ولم يتم غسلها بسهولة ، فلا بأس من تركها وعدم محاولة إزالتها.

الخطوة 2 العلاج



- بعد تنظيف الجرح ، قم بتغطية سطح الجرح بأكمله بطبقة سميكة كافية من فلامينال ، حوالي 0.5 سم.
- يمكنك وضع الفلامينال مباشرة على الجرح أو استخدام قضييب إذا تم تزويدك بواحد.
- يجب تجنب الاتصال المباشر بين أنبوب راحة اليد أو القضييب مع الجرح.

الخطوة 3 التضميد



- يجب تغطية الجرح حسب تعليمات الطاقم الطبي.
- يجب أن يتناسب اختيار الضمادة مع نوع الجرح: الجرح ذو الإفرازات المتعددة - يجب استخدام ضمادة ثانوية ماصة.
- الجروح ذات الإفرازات الأقل (`` أكثر جفافاً ``) - استخدم ضمادة ثانوية غير لزجة ، ولكن إذا بدأ الجرح في الإفراز ، فيجب إعادة تضميده بضمادة ماصة.
- يجب تغيير الضمادة كل يوم إلى 4 أيام أو حسب توصيات الطاقم الطبي.

*يرجى ملاحظة: يوصى بفحص الضمادة يوميًا. في الأيام الأولى من العلاج يوصى بتغيير الضمادة كل يومين وتقليل تكرار الاستبدال كل 3-4 أيام أو حسب توصية الطاقم الطبي.

